

Partie 1 : QCU (Choix unique)

Quelle est la teneur en matière sèche (MS) du foin ?

- a) Inférieure à 30%
- b) Entre 30% et 40%
- c) Supérieure à 80%
- d) Entre 50% et 60%

Quel fourrage est principalement utilisé pour les ruminants à forte production comme les vaches laitières ?

- a) Foin
- b) Ensilage
- c) Plantes immatures
- d) Concentrés

Quels sont les principaux composants des fourrages prairiaux utilisés pour le foin ?

- a) Céréales et tubercules
- b) Graminées et légumineuses
- c) Fruits et oléagineux
- d) Racines et tubercules

La fermentation lactique est une caractéristique de quel type de fourrage ?

- a) Foin
- b) Ensilage
- c) Plantes immatures
- d) Fourrages concentrés

Partie 2 : Vrai/Faux

Le foin est généralement récolté lorsque les plantes ont atteint leur maturité complète.

- Vrai Faux

Les plantes immatures peuvent être utilisées fraîches ou ensilées.

- Vrai Faux

La matière sèche est le résidu d'un produit après évaporation de l'eau qu'il contient.

- Vrai Faux

L'ensilage a une teneur en matière sèche supérieure à celle du foin.

- Vrai Faux

